

Analisis Kadar Logam Berat Timbal

by Ananda Septi

Submission date: 30-May-2023 09:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2104932364

File name: r_Logam_Berat_Timbal_Pb_pada_Urin_Nelayan_di_Desa_Junganyar.docx (28.03K)

Word count: 1505

Character count: 8864

Analysis Of Levels Of Heavy Lead (Pb) In Fishermen's Urine In Junganyar Coastal Village, Socah District, Bangkalan Regency Based On Passive Smokers And Active Smokers Using Atomic Amborance Spectrophotometer (AAS) Method

Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Urin Nelayan Di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Perokok Pasif Dan Perokok Aktif Dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

ABSTRACT. *The sea is one of the landfills, either directly or by various activities carried out by humans. One of them is dangerous chemicals that are thrown into the sea. Therefore, fishermen are at risk of exposure to these harmful chemicals either directly. In addition, fishermen also harmful contents including heavy metals Fe and Pb. Iron (Fe) is a heavy metal that is toxic if there are excessive levels in the body. This study aims to determine the levels and relationship between ferrous Metals (Fe) and Lead (Pb) in fishermen's urine in Junganyar Pesisir Village, Socah district, Bangkalan regency based on active smokers and passive smokers. This study is an experimental study with a total sample of 16 fishermen using the Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Method. The results of the study obtained iron (Fe) levels below the threshold of 0,3 mg/L and lead (Pb) 0,15 mg/L.*

Keywords : Fishermen, Heavy Metal Fe and Pb, Cigarettes, Atomic Absorption Spectrophotometer, Toxicity

ABSTRAK. Laut adalah salah satu tempat pembuangan sampah baik itu secara langsung ataupun oleh berbagai aktivitas yang dibuang ke laut. Oleh karena itu nelayan beresiko terpapar bahan kimia berbahaya tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu nelayan juga rokok terdapat kandungan yang berbahaya diantaranya logam berat Fe dan Pb. Besi (Fe) merupakan logam berat yang bersifat toksik jika terdapat kadar yang berlebihan di dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar dan hubungan antara logam Besi (Fe) dan Timbal (Pb) pada urin nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan berdasarkan perokok aktif dan perokok pasif. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan jumlah sampel 16 orang nelayan dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

Kata kunci : Nelayan, Logam berat Fe dan Pb, Rokok, Spektrofotometer Serapan Atom, Toksisitas

3

I.PENDAHULUAN

Logam berat dibedakan menjadi dua jenis yaitu logam berat esensial dan logam berat non esensial. Logam berat esensial adalah logam dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisme yang dapat menimbulkan efek toksik dalam jumlah berlebihan sedangkan logam berat non esensial merupakan logam berat yang belum diketahui manfaatnya bahkan juga bersifat racun [1].

Logam berat juga merupakan suatu unsur logam yang memiliki massa jenis yang sangat tinggi. Dalam lingkungan logam berat sangat berbahaya karena logam berat tidak dapat dihancurkan oleh organisme. Pencemaran dari logam berat ialah salah satu dari masalah yang sering kali terjadi di daerah perairan atau pesisir, banyak zat berbahaya seperti logam berat yang dibuang ke sungai yang dapat mengalir ke laut dan mempengaruhi kualitas lingkungan perairan [2].

Bahan pencemar logam berat bisa berasal dari kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi laut, kegiatan industri maupun kegiatan pertanian yang bisa masuk ke perairan dan dapat mempengaruhi kualitas perairan yang bisa berakibat pada terganggunya ekosistem alami dari lingkungan perairan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia [2].

Laut adalah perpaduan dari air asin dengan jumlah yang sangat banyak serta luas yang menggenangi serta membagi daratan menjadi benua dan pulau. Laut adalah air asin yang menutupi bagian atas tanah yang sangat luas serta biasanya mengandung garam dan terasa asin. Umumnya air yang mengalir dari darat akan bermuara menuju laut. Di laut juga merupakan salah satu tempat dari pembuangan sampah baik itu secara langsung ataupun oleh berbagai aktifitas yang dilakukan manusia [3].

Nelayan merupakan kelompok pekerja yang berperan penting dalam proses penangkapan ikan dan penyediaan ikan di pasaran, namun nelayan juga beresiko terpapar dari bahan kimia berbahaya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dibuang ke laut. Laut juga merupakan salah satu tempat dari pembuangan sampah baik itu secara

langsung ataupun limbah oleh berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Maka dari itu di laut dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar terutama logam berat [4].

Merokok merupakan faktor utama penyebab meningkatnya penyakit kardiovaskuler melalui kadar profil lipid. Satu batang rokok mengandung bahan kimia sebanyak 4.000 jenis, salah satunya yaitu nikotin. Merokok juga memiliki dampak negatif. [5].

Air yaitu merupakan senyawa yang sangat melimpah pada permukaan bumi. Sifat-sifat dari air ini memiliki pengaruh yang berarti digunakan untuk penyediaan air, kualitas air dan teknik dalam pengolahan air (Esteria, 2017). Indikator atau yang biasanya disebut tanda bahwa air dalam lingkungan yang telah tercemar yaitu terdapat perubahan atau tanda yang bisa diamati lewat adanya perubahan suhu air, perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen, perubahan rasa, bau dan warna air, timbulnya endapan, bahan terlarut, koloidal adanya mikroorganisme dan meningkatnya radioaktif lingkungan. Air yang normal dapat digunakan untuk kehidupan, pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa [6].

Pencemaran perairan yang diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar yang dapat berupa gas, zat-zat terlarut dan partikulat, pencemaran air dapat menyebabkan kurangnya keanekaragaman atau punahnya organisme perairan seperti bentos, perifiton dan plankton. Hal ini menyebabkan ekologis perairan yang terganggu. Ekosistem perairan juga cenderung memurnikan lingkungan tercemar yang berada dalam daya dukung lingkungan yang terkontaminasi [7].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara logam berat Besi (Fe) dan Timbal (Pb) pada urin nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan berdasarkan perokok aktif dan pasif dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

II. METODE

Desain penelitian ini dilakukan secara eksperimental untuk mengetahui kadar logam timbal (Pb) pada urin nelayan perokok aktif dan pasif di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel sewaktu atau cross section. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni-Juli 2022. Tempat Penelitian ini dilakukan di Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, di Laboratorium Kimia Terapan FKES Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk preparasi sampel urin nelayan dan di Laboratorium Kimia FMIPA UIN Maulana Malik Ibrahim untuk pengujian Pb dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Penelitian ini dilakukan setelah mendapat surat keterangan lolos kaji etik dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudua Husada Madura dengan nomor 1302/KEPK/STIKES-NHM/EC/VI/2022.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Distribusi Responden

Perokok	Jumlah (n)	Presentase %
Ya	8	50
Tidak	8	50
Total	16	100

Berdasarkan Tabel 1. didapatkan rata-rata sebanyak 8 nelayan yang merokok atau tidak merokok dengan presentase sebesar 50%.

Tabel 2. Data Distribusi Kategori Jumlah Konsumsi Rokok Dalam Sehari

Jumlah Batang Rokok	Jumlah (n)	Presentase %
5-10	2	25
>10	6	75
Total	8	100

Berdasarkan Tabel 2. didapatkan jumlah responden perokok yaitu 8 orang nelayan, ada nelayan yang menghabiskan 5-10 batang dalam sehari dengan presentase 25%, 6 orang nelayan yang menghabiskan rokok >10 dalam sehari dengan presentase 75%.

Tabel 3. Kadar Logam Timbal (Pb)

No	Sampel	Jumlah rokok perhari	Aktif	Pasif	Sampel
1.	Sampel A	>10	-0,022	-0,016	Sampel B
4.	Sampel D	5-10	-0,009	-0,009	Sampel C
5.	Sampel E	>10	-0,007	-0,018	Sampel I
6.	Sampel F	>10	-0,011	-0,004	Sampel K
7.	Sampel G	>10	0,006	0,004	Sampel L
8.	Sampel H	>10	0,006	-0,016	Sampel M
10.	Sampel J	5-10	-0,013	-0,009	Sampel N
15.	Sampel O	>10	0,006	-0,007	Sampel P
Rata-Rata			-0,0055	-0,009375	Rata-Rata

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perokok aktif lebih tinggi. Hal ini dikarenakan menurut Permatasari (2017) mengatakan bahwa perokok pasif tidak terlalu sering menghirup asap rokok dan berusaha menghindari paparan langsung dari asap rokok dengan menggunakan masker [9].

Tetapi hasil pemeriksaan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada Tabel 3 terdapat nilai yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kadar logam berat pada sampel sangat kecil sehingga tidak dapat terdeteksi oleh alat dimana limit deteksi alat yaitu 0,016 mg/L. Selain itu juga dapat disebabkan karena murninya sampel urin pada saat dilakukan proses preparasi atau masih terdapat zat pengganggu [10].

Setelah dilakukan uji normalitas diketahui data uji normalitas Shapiro-Wilk memiliki nilai sig 0,111 ikansi kadar r Timbal (Pb) pada perokok aktif sebesar 0,191 dan perokok pasif sebesar 0,394. Jadi nilai sig nya > 0,05, maka dapat diartikan data terdistribusi normal

Tabel 3. Korelasi Kadar Timbal (Pb)

Correlations					
		Perokok	Pb		
Perokok	Pearson Correlation				
	Sig. (2-tailed)				
	N	16	16		
Pb	Pearson Correlation	-.223			
	Sig. (2-tailed)	.406			
	N	16	16		

Berdasarkan hasil uji korelasi pearson SPSS pada kadar Timbal (Pb) menunjukkan tidak adanya hubungan antara kadar Timbal (Pb) dengan perokok aktif dan perokok pasif pada Nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan responden tidak selalu berada di laut, tetapi hanya dalam waktu kerja atau waktu tertentu saja mereka berada di laut dan kemungkinan besar responden melakukan pola hidup sehat ketika berada dirumah seperti mengkonsumsi air yang cukup, sayuran dan buah-buahan. Hal ini dapat membuat akumulasi kadar besi dan timbal berkurang dan dapat di eksresikan oleh ginjal melalui urin [5].

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh kadar Timbal (Pb) yaitu 0,15 mg/L. Sehingga tidak terdapat hubungan antara kadar Timbal (Pb) berdasarkan perokok aktif dan perokok pasif pada Nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya sampaikan untuk kedua orang tua yg telah membantu kelancaran penelitian ini terutama dalam pendanaan dan saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini.

Analisis Kadar Logam Berat Timbal

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Desy Tamala, Galuh Ratmana Hanum.
"Analysis Of Lead (Pb) Heavy Metal Content In Smoking Farmers", Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology), 2022
Publication | 2% |
| 2 | Muhammad Azhari. "Analisis Manfaat Tanaman Terhadap Kondisi Lingkungan di Jalan Utama Kota Palangka Raya", Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 2019
Publication | 2% |
| 3 | Jamilatur Rohmah, Niken Anggita Miranda, Mariany Lambertine Marlina, Uus Ufita Fiya.
"Heavy Metal Content in Hair at Workers in Gas Station of Sidoarjo City in 2021", Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology), 2021
Publication | 2% |
| 4 | Kusnadi Kusnadi. "ANALISA KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) DALAM TANAMAN LIDAH MERTUA (SANSIVIERA Sp.) DI KOTA TEGAL DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETER | 1% |

SERAPAN ATOM (SSA)", PSEJ (Pancasakti
Science Education Journal), 2016

Publication

- 5 Annisa Siti Rufaidah, Suparno, Ujang Jamaludin. "Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Pada Siswa di SD Negeri Sukamulya I Melalui Program KURASSAKI", JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA, 2020

Publication

1 %

- 6 Nur Asia Selayar, Sipriana Tumembouw, Lukas L.J.J Mondoringin. "Telaah Kandungan Logam Berat Merkuri (Hg) Di Sekitar Teluk Manado (Analysis Heavy Metal Content of Mercury (Hg) Around the Bay of Manado)", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2019

Publication

1 %

- 7 Yusthinus T Male, Dominggus Malle, Catherina Manukpadang Bijang, Eirene Grace Fransina et al. "Analysis of Cadmium (Cd) and Lead (Pb) Metals Content On Sediment Inner Part of Ambon Bay", Indo. J. Chem. Res., 2017

Publication

1 %

- 8 Cholifah Cholifah, Alfinda Ayu Hadikasari. "HUBUNGAN ANEMIA, STATUS GIZI, OLAHRAGA DAN PENGETAHUAN DENGAN KEJADIAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI", Midwiferia, 2016

Publication

1 %

-
- 9 Djamilah Arifiyana, Vika Ayu Devianti, Ratih Kusuma Wardani. "Edukasi Bahaya Logam Berat dalam Tubuh dan Sumber Kontaminannya", Jurnal Abdi Masyarakat Kita, 2023 1 %
Publication
-
- 10 Fiskanita Fiskanita, Baharuddin Hamzah, Supriadi Supriadi. "Analisis Logam Timbal (Pb) Dan Besi (Fe) Dalam Air Laut Di Pelabuhan Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo", Jurnal Akademika Kimia, 2017 1 %
Publication
-
- 11 Putri Intan Permata Sari, Fitri Yeni, Ramdani Bayu Putra, Rosa Citra Dewi. "The Influence Of The Level Of Tax Awareness And Tax Payment Mechanisms On Buying And Selling Traffic On The Online Shop", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2021 1 %
Publication
-
- 12 Celso Claudio de Hildebrand e Grisi. "Uma análise de marketing sobre a expansão do comércio exterior brasileiro", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2001 <1 %
Publication
-
- 13 RUBASHA MATIKU MUJAMA, TOMOHIRO UCHIYAMA. "Contracting and Negotiation Attributes: A Case of Sunflower Seed Crop in <1 %

Central Tanzania", International Journal of Environmental and Rural Development, 2021

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Indonesian Journal of Cultural and Community Development

ISSN 2615-6180 (ONLINE)



BROUGHT TO YOU BY

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Conflict of Interest Statement

The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Editorial Team

Editor in Chief

[Dr. Totok Wahyu Abadi \(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia\)](#) [Scopus]

Managing Editor

[Mochammad Tanzil Multazam \(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia\)](#) [Scopus]

[Rohman Dijaya \(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia\)](#) [Scopus]

Member of Editors

[Mahardhika Darmawan Kusuma Wardana \(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia\)](#) [Sinta]

[Bobur Sobirov \(Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan\)](#) [Google Scholar]

[Farkhod Abdurakhmonov \("Silk Road" International University of Tourism, Uzbekistan\)](#) [Google Scholar]

[Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa \(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SURabaya, Indonesia\)](#) [Scopus]


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))



How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Analysis Of Levels Of Heavy Lead (Pb) in Fishermen's Urine in Junganyar Coastal Village Based on Passive Smokers and Active Smokers Using Atomic Amborance Spectrophotometer (AAS) Method

Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada Urin Nelayan di Desa Junganyar Berdasarkan Perokok Pasif dan Perokok Aktif dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Ananda Septiya Putri, septiaecek02@gmail.com, (0)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Galuh Ratmana Hanum, galuhratmanahanum@umsida.ac.id, (1)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

(1) Corresponding author

Abstract

The sea is one of the landfills, either directly or by various activities carried out by humans. One of them is dangerous chemicals that are thrown into the sea. Therefore, fishermen are at risk of exposure to these harmful chemicals either directly. In addition, fishermen also have a smoking habit where in cigarettes there are harmful contents including heavy metals Pb. Lead (Pb) is a heavy metal that is toxic to human health. This study aims to determine the levels and relationship between ferrous Metals Lead (Pb) in fishermen's urine in Junganyar Pesisir Village, Socah district, Bangkalan regency based on active smokers and passive smokers. This study is an experimental study with a total sample of 16 fishermen using the Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Method. The results of the study obtained lead (Pb) also below the threshold of 0,15 mg/L Pearson 0,05 (0,406) so that H0 was accepted and said there was no relationship between heavy metals and active and passive smokers.

Pendahuluan

Logam berat dibedakan menjadi dua jenis yaitu logam berat esensial dan logam berat non essensial. Logam berat esensial adalah logam dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisme yang dapat menimbulkan efek toksik dalam jumlah berlebihan sedangkan logam berat non esensial merupakan logam berat yang belum diketahui manfaatnya bahkan juga bersifat racun [1].

Logam berat juga merupakan suatu unsur logam yang memiliki massa jenis yang sangat tinggi. Dalam lingkungan logam berat sangat berbahaya karena logam berat tidak dapat dihancurkan oleh organisme. Pencemaran dari logam berat ialah salah satu dari masalah yang sering kali terjadi di daerah perairan atau pesisir, banyak zat berbahaya seperti logam berat yang dibuang ke sungai yang dapat mengalir ke laut dan mempengaruhi kualitas lingkungan perairan [2].

Bahan pencemar logam berat bisa berasal dari kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi laut, kegiatan industri maupun kegiatan pertanian yang bisa masuk ke perairan dan dapat mempengaruhi kualitas perairan yang bisa berakibat pada terganggunya ekosistem alami dari lingkungan perairan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia [2].

Laut adalah perpaduan dari air asin dengan jumlah yang sangat banyak serta luas yang menggenangi serta membagi daratan menjadi benua dan pulau. Laut adalah air asin yang menutupi bagian atas tanah yang sangat luas serta biasanya mengandung garam dan terasa asin. Umumnya air yang mengalir dari darat akan bermuara menuju laut. Di laut juga merupakan salah satu tempat dari pembuangan sampah baik itu secara langsung ataupun oleh berbagai aktifitas yang dilakukan manusia [3].

Nelayan merupakan kelompok pekerja yang berperan penting dalam proses penangkapan ikan dan penyediaan ikan di pasaran, namun nelayan juga beresiko terpapar dari bahan kimia berbahaya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dibuang ke laut. Laut juga merupakan salah satu tempat dari pembuangan sampah baik itu secara langsung ataupun limbah oleh berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Maka dari itu di laut dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar terutama logam berat [4].

Merokok merupakan faktor utama penyebab meningkatnya penyakit kardiovaskuler melalui kadar profil lipid. Satu batang rokok mengandung bahan kimia sebanyak 4.000 jenis, salah satunya yaitu nikotin. Merokok juga memiliki dampak negatif. Sebagian besar masyarakat indonesia terpapar oleh asap rokok yang dapat menyebabkan kematian baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Meningkatnya jumlah perokok maka peningkatan penyakit akibat rokok semakin tinggi diantaranya yaitu kanker, jantung, stroke dan juga diabetes [5].

Air yaitu merupakan senyawa yang sangat melimpah pada permukaan bumi. Sifat-sifat dari air ini memiliki pengaruh yang berarti digunakan untuk penyediaan air, kualitas air dan teknik dalam pengolahan air (Esteria, 2017). Indikator atau yang biasanya disebut tanda bahwa air dalam lingkungan yang telah tercemar yaitu terdapat perubahan atau tanda yang bisa diamati lewat adanya perubahan suhu air, perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen, perubahan rasa, bau dan warna air, timbulnya endapan, bahan terlarut, koloidal adanya mikroorganisme dan meningkatnya radioaktif lingkungan. Air yang normal dapat digunakan untuk kehidupan, pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa [6].

Pencemaran perairan yang diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar yang dapat berupa gas, zat-zat terlarut dan partikulat, pencemaran air dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman atau punahnya organisme perairan seperti bentos, perifiton dan plankton. Hal ini menyebabkan ekologis perairan yang terganggu. Ekosistem perairan juga mampu memurnikan lingkungan tercemar yang berada dalam daya dukung lingkungan yang terkontaminasi [7].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2017) mengenai pengaruh perokok aktif dan perokok pasif terhadap kadar Hemoglobin didapatkan hasil bahwa 10 dari 15 perokok aktif dan 6 dari 10 perokok pasif memiliki kadar hemoglobin yang sama tingginya (abnormal). Dengan hasil nilai $p < 0,05$ yang berarti bahwa ada pengaruh yang bermakna baik perokok aktif maupun perokok pasif terhadap kadar hemoglobin di dalam darah [8].

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tapani (2019) tentang perbandingan kadar logam berat timbal (Pb) dalam urin perokok aktif dan perokok pasif pekerja SPBU di lubuk buaya kota padang, terbukti bahwa 5 orang dari 10 orang memiliki kandungan timbal yang normal sedangkan sisanya 5 orang lagi mendapatkan hasil kadar yang tidak normal. Dari data yang diperoleh kadar timbal berdasarkan lama merokok, umur dan lama paparan rokok, bisa dipastikan bahwa perokok pasif akan lebih beresiko karena terpapar oleh asap rokok yang mempunyai salah satu kandungan logam berat yaitu timbal [9].

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi logam dalam suatu senyawa dengan terlebih dahulu menyemprotkan senyawa tersebut. Metode SSA pemeriksaan kandungan besi (Fe) menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom dengan nyala dan panjang gelombang 248,8 nm sedangkan timbal (Pb) menggunakan panjang gelombang 284 nm [10].

Kelebihan dari Spektrofotometer Serapan Atom yaitu kecepatan analisisnya dapat digunakan untuk menentukan semua unsur pada konsentrasi runut (ketelitiannya sampai tingkat runut/trace) dan sebelum pengukuran sampel tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur yang lain dapat dilakukan asalkan tersedianya lampu katoda berongga sedangkan kekurangan spektrofotometer serapan atom yaitu kurang sensitif untuk pengukuran sampel bukan sampel logam dan adanya gangguan-gangguan [11]

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara logam berat Timbal (Pb) pada urin nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan berdasarkan perokok aktif dan pasif dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

Metode Penelitian

Desain penelitian ini dilakukan secara eksperimental untuk mengetahui kadar logam berat timbal (Pb) pada urin nelayan berdasarkan perokok aktif dan perokok pasif di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel sewaktu atau cross section. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni-Juli 2022 Tempat Penelitian ini dilakukan di Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, di Laboratorium Kimia Terapan FIKES Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk preparasi sampel urin nelayan dan di Laboratorium Kimia FMIPA UIN Maulana Malik Ibrahim yang terletak di jalan Gajayana Kota Malang Jawa Timur untuk pengujian kadar logam berat dan Pb dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Penelitian ini dilakukan setelah mendapat surat keterangan lolos kaji etik dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura dengan nomor 1302/KEPK/STIKES-NHM/EC/VI/2022.

Hasil dan Pembahasan

Perokok	Jumlah (n)	Presentase %
Ya	8	50
Tidak	8	50
Total	16	100

Table 1. Data Distribusi Responden

Berdasarkan Tabel 1. didapatkan sama rata sebanyak 8 nelayan yang merokok atau dan tidak merokok dengan presentase sebesar 50%.

Jumlah Batang Rokok	Jumlah (n)	Presentase %
5-10	2	25
>10	6	75
Total	8	100

Table 2. Data Distribusi Kategori Jumlah Konsumsi Rokok Dalam Sehari

Berdasarkan Tabel 2. didapatkan dari jumlah responden perokok yaitu 8 orang nelayan, ada nelayan yang menghabiskan 5-10 batang dalam sehari dengan presentase 25%, 6 orang nelayan yang menghabiskan rokok >10 dalam sehari dengan presentase 75%.

No	Sampel	Jumlah rokok perhari	Aktif	Pasif	Sampel
1.	Sampel A	>10	-0,022	-0,016	Sampel B
4.	Sampel D	5-10	-0,009	-0,009	Sampel C
5.	Sampel E	>10	-0,007	-0,018	Sampel I
6.	Sampel F	>10	-0,011	-0,004	Sampel K
7.	Sampel G	>10	0,006	0,004	Sampel L
8.	Sampel H	>10	0,006	-0,016	Sampel M
10.	Sampel J	5-10	-0,013	-0,009	Sampel N
15.	Sampel O	>10	0,006	-0,007	Sampel P
Rata-Rata		-0,0055	-0,009375	Rata-Rata	

Table 3. Hasil Pengukuran Kadar Logam Timbal (Pb) Menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Berdasarkan data pada Tabel 3. untuk pemeriksaan kadar Timbal (Pb) menunjukkan hasil dengan nilai tertinggi yaitu pada sampel 7, 8 dan sampel 15 yaitu responden yang merupakan perokok aktif dengan kadar 0,006 mg/L dan nilai terendah dari sampel 11 yaitu responden yang merupakan perokok pasif dengan kadar -0,004 mg/L dan rata-rata hasil kadar Timbal pada perokok aktif adalah -0,0055 mg/L sedangkan pada perokok pasif adalah -0,009375 mg/L. Kadar Timbal (Pb) pada urin nelayan di desa junganyar pesisir berdasarkan perokok aktif dan perokok pasif di bawah nilai ambang batas yaitu -0,0074 berdasarkan permenkes Nomor 1406/MENKES/SK/XI/2022 yaitu 0,15 mg/L.

Diketahui bahwa kadar dari perokok aktif lebih tinggi dibandingkan dengan perokok pasif. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa perokok pasif memiliki resiko lebih tinggi dari pada perokok aktif yang disebabkan oleh paparan asap rokok yang mengandung salah satu dampak masalah negatif dari asap rokok terhadap kesehatan manusia [12].

Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perokok aktif lebih tinggi. Hal ini dikarenakan menurut Permatasari (2017) mengatakan bahwa perokok pasif tidak terlalu sering menghirup asap rokok dan berusaha menghindari paparan langsung dari asap rokok dengan menggunakan masker [13].

Tetapi hasil pemeriksaan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada Tabel 3 terdapat nilai yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kadar logam berat pada sampel sangat kecil sehingga tidak dapat terdeteksi oleh alat dimana limit deteksi alat yaitu 0,016 mg/L. Selain itu juga dapat disebabkan karena murninya sampel urin pada saat dilakukan proses preparasi atau masih terdapat zat pengganggu [14].

Setelah dilakukan uji normalitas diketahui data uji normalitas Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikansi kadar r Timbal (Pb) pada perokok aktif sebesar 0,191 dan perokok pasif sebesar 0,394. Jadi nilai sig nya > 0.05, maka dapat diartikan data terdistribusi normal.

Correlations			
Perokok	Pb		
Perokok	Pearson Correlation	1	-.223
	Sig. (2-tailed)	.406	
	N	16	16
	Pb	Pearson Correlation	-.223
		Sig. (2-tailed)	.406
		N	16

Table 4. Korelasi Kadar Timbal (Pb)

Berdasarkan hasil uji kolerasi pearson SPSS pada kadar Timbal (Pb) menunjukkan tidak adanya hubungan antara kadar Timbal (Pb) dengan perokok aktif dan perokok pasif pada Nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan responden tidak selalu berada di laut, tetapi hanya dalam waktu kerja atau waktu tertentu saja mereka berada di laut dan kemungkinan besar responden melakukan pola hidup sehat ketika berada dirumah seperti mengkonsumsi air yang cukup, sayuran dan buah-buahan. Hal ini dapat membuat akumulasi kadar besi dan timbal berkurang dan dapat di eksresikan oleh ginjal melalui urin [15].

Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh kadar Timbal (Pb) juga di bawah ambang batas yaitu 0,15 mg/L. Hasil uji kolerasi menunjukkan data dengan nilai signifikan > 0.05 sehingga H_0 Diterima, jadi tidak terdapat hubungan antara kadar Timbal (Pb) berdasarkan perokok aktif dan perokok pasif pada Nelayan di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

References

1. Hasni, N. A. M., & Ulfa, A. M. (2016). Jurnal Analis Farmasi. Vol 1, No.3 Hal 163-168.
2. Fairuz, H. (2019). Analisis Logam Berat Timbal (Pb) pada Sedimen dan Akar Avicerraria Marina di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Jawa Timur. (Skripsi). Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/170680>.

3. Lianda, J., Enda, D., Ariadi., Suhaimi., Wira, M. (2015). Pengolahan Air Laut Menggunakan Generator Uap Untuk Menghasilkan Air Tawar. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/2837>.
4. Amalia, R. (2019). Desain Elektroda Selektif Ion Fe (II) Menggunakan Ionofor 1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-Diazasiklo-Oktadekana Untuk Analisis Logam Fe(II) pada Sedimen Laut di Pelabuhan Kota Parepare. (Skripsi). Universitas Hasanuddin Makasar. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3458/>.
5. Hidayah, M. (2021). Uji Kadar Timbal (Pb) dan Kadnium (Cd) pada Urin Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Sampah Berdasarkan Perokok Aktif dan Perokok Pasif dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
6. Wardhana, W. A. (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan. Cetakan Keempat Yogyakarta: Penerbit ANDI.
7. Salam. A. R. (2010). Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Yudistira.
8. Mayaserli, D.P., Renowati., 2017, Analisis Kadar Logam Timbal (Pb) pada Rambut Karyawan SPBU. Journal of Sainstek 9(1):19-25. <https://doi.org/10.31958/js/v9i1.606>.
9. Permatasari, V.S. (2017). Pengaruh Perokok Aktif dan Perokok Pasif Terhadap Kadar Hemoglobin. (KTI). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang. Retrieverd from : <https://repo.stikesicme-jbg.ac.id>.
10. Sari, A.D., Guli, M. M., & Miswan, M. (2013). Uji Kandungan Plumbum (Pb) Dalam Urine Karyawan SPBU Bayoegge Kota Palu. Biocelebes, 7(1). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Biocelebes/article/view/3904/2866>